


A133 Oedicnème criard

Oiseaux / Burhinidés /
Burhinus oedicnemus.

Directive Oiseaux : annexe I.
Espèce protégée en France par
l'A.M. du 29 octobre 2009.

Localisation de l'espèce



Territoires principaux (sources : EPOB, AOSML, LPO 89, LPO 21, SOBA Nature Nièvre - données 1995-2008)

Oiseau présent dans les grandes vallées alluviales de la Loire, l'Allier et du Doubs, ainsi que dans les pelouses pâturées (surtout dans la Côte chalonaise) et certains champs caillouteux des plateaux calcaires, où il niche encore en très petit nombre (plus abondant autrefois).

Mode de vie et besoins écologiques

L'oedicnème est une espèce migratrice qui arrive au printemps et repart en automne, après des rassemblements en bandes. Cet oiseau se nourrit au crépuscule et à l'aube d'insectes, vers de terre, limaces, escargots, grenouilles, petits reptiles... Le couple dépose 1 à 3 œufs mimétiques à même le sol nu, dans les graviers des cours d'eau, caractérisés par une dynamique fluviale active, ou dans les cailloux des pelouses calcaires arides et pâturées (végétation rase), ainsi que dans les cultures et les friches.

Habitat(s) de l'espèce

Habitat de reproduction : bancs de graviers des cours d'eau actifs (3270) et pelouses rases (6110*, 6210).

Habitats d'alimentation variés : bord des cours d'eau, prairies, cultures...



Etat de conservation en Bourgogne : moyen.

L'espèce ne semble pas menacée en Bourgogne mais reste dépendante des pratiques agricoles et du maintien de la dynamique fluviale.

Ce limicole terrestre possède un plumage brun clair, strié de noir sur le dos, ce qui lui confère la capacité de se camoufler. Les ailes sont brun-noir avec deux bandes claires, bien visibles en vol. Il est campé sur de longues pattes jaunes. Sa grosse tête ronde, au bec jaune à la base et noir à son extrémité, présente deux grands yeux jaunes caractéristiques. Son mode de vie est principalement nocturne.



Remarquez sa grosse tête et ses grands yeux jaunes



Éléments d'appréciation des incidences des aménagements

Vulnérabilité moyenne

Représentation en Bourgogne : assez rare.

Tendance évolutive : stable.

Capacité de récupération en cas de perturbation : moyenne.

CONSEILLÉ

- Respect de la dynamique fluviale.
- Incitations agricoles pour le pâturage extensif des pelouses calcaires.
- Information des usagers (pêcheurs, baigneurs, promeneurs...) à la sensibilité des oiseaux des grèves.

A ÉVITER

- Modification de la dynamique fluviale des grands cours d'eau.
- Atterrissement et boisement des grèves.
- Embuisonnement des pelouses calcaires.
- Dérangeant au printemps sur les grèves des grands cours d'eau.

Diagnostic de présence

Prospection dans les milieux favorables à la jumelle ou par écoutes crépusculaires ou nocturnes (l'oiseau est bruyant lors de ses déplacements nocturnes).