


A234 Pic cendré
Oiseaux / Pucidés / *Picus canus*

A236 Pic noir
Oiseaux / Pucidés / *Dryocopus
martius*

A238 Pic mar
Oiseaux / Pucidés /
Dendrocopos medius

Directive Oiseaux : annexe I.
Espèces protégées en France
par l'A.M. du 29 octobre 2009.

Localisation



Carte de répartition du
Pic mar (V. Godreau,
com. pers.).

Pic noir et pic cendré assez communs en Bourgogne. Pic mar bien présent dans les grandes chênaies de plaine et de plateaux calcaires, et dans les gros massifs autour du Morvan.

Mode de vie et besoins écologiques

Les pics sont des oiseaux sédentaires, arboricoles et grimpeurs. Leur bec puissant est utilisé pour creuser dans le bois à la recherche de larves d'insectes et pour forer des cavités dans lesquelles ils nichent. Ils contribuent ainsi au recyclage de la biomasse ligneuse et leurs loges sont utiles à d'autres espèces comme les chouettes, les chauves-souris... Ils consomment également des fourmis, prises à terre ou dans le bois mort. Les trois espèces vivent dans des futaies âgées, bien structurées avec présence d'arbres morts. Le pic mar est un hôte des vieilles futaies de chênes tandis que le pic noir est plus fréquent dans les hêtraies. Le pic cendré est éclectique (vieilles futaie, ripisylves, bocage...) sans jamais être abondant.



Pic mar

Le **pic noir** est facile à identifier avec sa grande taille et son plumage de jais, sa calotte rouge vif (moins étendue chez la femelle que chez le mâle).

Le **pic cendré** ressemble au pic vert dont il diffère par sa taille plus petite, la tête grise, une tache rouge limitée au front (mâle) et la présence d'une moustache noire à l'arrière du bec.

Le **pic mar** ressemble au pic épeiche par sa taille et son plumage noir et blanc. Il s'en distingue notamment par une calotte rouge chez les deux sexes et les jeunes (pic épeiche : calotte uniquement chez les jeunes) et par son chant.



Jeune pic cendré



Jeunes pics noirs

Habitat(s) des espèces

Divers types de forêts riches en gros bois et en bois mort (9120, 9130, 9150, 9160, 9180, 91OE*, 91FO).



Etat de conservation en Bourgogne : bon.

Liste rouge des espèces menacées en France : pic cendré en catégorie vulnérable.

Ces trois espèces sont assez bien représentées dans les massifs forestiers de Bourgogne.



Éléments d'appréciation des incidences des aménagements

Vulnérabilité faible

Représentation en Bourgogne : communs.

Tendance évolutive : stable (après une augmentation récente du pic noir).

Capacité de récupération en cas de perturbation : moyenne.

CONSEILLÉ A ÉVITER

- Gestion sylvicole ménageant des gros bois, des îlots de vieillissement et du bois mort sur pied.
- Maintien d'arbres à cavités.

- Elimination des vieux arbres et du bois mort.
- Remplacement massif des feuillus par les résineux.
- Sylviculture à rotation rapide, avec pas ou peu de gros bois.

Diagnostic de présence

Observations, points d'écoute des chants et des tambourinages au printemps.