


# A072 Bondrée apivore

Oiseaux / Accipitridés / *Pernis apivorus*

Directive Oiseaux : annexe I.  
Espèce protégée en France par  
l'A.M. du 29 octobre 2009.

## Localisation de l'espèce



La bondrée se rencontre partout en Bourgogne, un peu moins dans le Nord-Ouest où les paysages de grandes cultures lui sont moins favorables.



La bondrée apivore a une tête grise typique

## Mode de vie et besoins écologiques

La bondrée apivore est un migrateur strict et elle arrive courant mai pour repartir début septembre en groupes. Elle est, en effet, très dépendante des hyménoptères (abeilles, guêpes, bourdons) pour son alimentation. Après avoir repéré le manège de ces insectes sociaux, elle déterre les couvains de ses doigts longuement griffus. Elle mange également d'autres insectes, des petits rongeurs et des batraciens.

## Habitat(s) de l'espèce

Habitats variés : prairies de fauche (6510) et de pâture, bocage, cultures, forêts...



**Etat de conservation en Bourgogne : bon.**

La bondrée apivore est bien représentée en Bourgogne (plus de 100 couples) et ne semble pas menacée.



## Éléments d'appréciation des incidences des aménagements

### Vulnérabilité faible

Représentation en Bourgogne : commun.

Tendance évolutive : stable.

Capacité de récupération en cas de perturbation : moyenne.

## CONSEILLÉ A ÉVITER

• Incitations agricoles pour le maintien des prairies, du bocage, ainsi que la limitation des insecticides.

• Réduction du bocage, simplification des paysages agricoles.  
• Usage des produits insecticides (épandage et grains enrobés) qui limitent les populations d'abeilles.  
• Densification des installations éoliennes.

## Diagnostic de présence

Observations durant la période de reproduction.  
Sollicitation des associations ornithologiques.