


A073 Milan noir

Oiseaux / Accipitridés / *Milvus migrans*.

Directive Oiseaux : annexe I.
Espèce protégée en France par
l'A.M. du 29 octobre 2009.

Localisation de l'espèce



Le milan noir se rencontre partout en Bourgogne, avec une moindre représentation dans l'Yonne.

Le milan noir est de couleur brun foncé assez uniforme chez les deux sexes. Sa queue est moins échancrée que celle du milan royal dont il se distingue aussi par une taille inférieure et une allure moins svelte. Il émet des sifflements tremblés comme un hennissement.



Milan noir

Mode de vie et besoins écologiques

Le milan noir est un migrateur et ne s'observe que de la mi-mars à août. Il niche sur des arbres isolés ou en lisière dans une aire garnie de branches et de débris (papier, chiffons...). La période de reproduction s'étale de fin avril à mi-juillet. Ce rapace est éclectique et opportuniste pour son alimentation : petits mammifères, poissons, insectes, cadavres, déchets... et à ce titre, il joue un rôle « d'éboueur ».

Habitat(s) de l'espèce

Habitats ouverts variés : prairies de fauche (6510) et de pâture, bocage, marais, plans d'eau (3150), grands cours d'eau (3260), canaux...

😊 Etat de conservation en Bourgogne : bon.

Le milan noir est bien représenté en Bourgogne, avec des effectifs compris entre 500 et 2000 couples.



Éléments d'appréciation des incidences des aménagements

Vulnérabilité faible

Représentation en Bourgogne : commun.

Tendance évolutive : stable.

Capacité de récupération en cas de perturbation : bonne.

CONSEILLÉ

- Incitations agricoles pour le maintien des prairies et du bocage.
- Limitation des pesticides contre les rongeurs.

A ÉVITER

- Réduction du bocage, simplification des paysages agricoles.
- Usage des produits anti-coagulants pour limiter les rongeurs.
- Coupe forestière lors de la reproduction (avril à juillet).

Diagnostic de présence

Observations durant la période de reproduction. Sollicitation des associations ornithologiques et des agriculteurs.